Devoir en classe n°2

Devoir 2 ; BTS 1 Analyses Biologiques ;
Année scolaire 2005/2006 ;
Le Lundi 7 Novembre 2005

□ SITUATION 1 :

Recherche de la solution générale de l'équation homogène associée, recherche d'une solution particulière par identification, puis écrire la solution générale de l'équation par utilisation du théorème général.

EXERCICE N°1 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $2y' - y = x^2$

① – Déterminer les réels a, b, c tels que la fonction f définie sur IR par $f(x) = ax^2 + bx + c$ soit solution de (E) ;

② – Soit (E₀) l'équation homogène associée à (E), résoudre (E₀) ;

③ – En déduire la solution générale de (E).

④ – Déterminer la fonction g, solution de (E), telle que $g(0) = 0$;

□ SITUATION 2 :

Le second membre est constant. On se ramène à une équation homogène par un changement de variables.

EXERCICE N°2 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $100y' - 5y = 40$

① – Déterminer la solution générale de (E) ;

② – Déterminer la fonction f, solution de (E), telle que $f(0) = 0$;

□ SITUATION 3 :

Recherche de la solution générale de l'équation homogène associée puis recherche de la solution générale de l'équation par utilisation de la méthode dite « de variation de la constante ».

EXERCICE N°3 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $y' - 2y = e^{-x}$

① – Soit (E₀) l'équation homogène associée à (E), résoudre (E₀) ;

② – On pose $y = u(x) e^{2x}$ où u est une fonction dérivable de la variable x ; déterminer u de façon que y soit solution de (E) ;

③ – En déduire la solution générale de l'équation (E).

Devoir en classe n°2

Devoir 2 ; BTS 1 Analyses Biologiques ;
Année scolaire 2005/2006 ;
Le Lundi 7 Novembre 2005

□ SITUATION 1 :

Recherche de la solution générale de l'équation homogène associée, recherche d'une solution particulière par identification, puis écrire la solution générale de l'équation par utilisation du théorème général.

EXERCICE N°1 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $2y' + y = -x^2$

① – Déterminer les réels a, b, c tels que la fonction f définie sur IR par $f(x) = ax^2 + bx + c$ soit solution de (E) ;

② – Soit (E₀) l'équation homogène associée à (E), résoudre (E₀) ;

③ – En déduire la solution générale de (E).

④ – Déterminer la fonction g, solution de (E), telle que $g(0) = 0$;

□ SITUATION 2 :

Le second membre est constant. On se ramène à une équation homogène par un changement de variables.

EXERCICE N°2 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $10y' + 3y = 36$

① – Déterminer la solution générale de (E) ;

② – Déterminer la fonction f, solution de (E), telle que $f(0) = 0$;

□ SITUATION 2 :

Recherche de la solution générale de l'équation homogène associée puis recherche de la solution générale de l'équation par utilisation de la méthode dite « de variation de la constante ».

EXERCICE N°2 :

* Soit (E) l'équation différentielle : $y' + 2y = e^x$

① – Soit (E₀) l'équation homogène associée à (E), résoudre (E₀) ;

② – On pose $y = u(x) e^{-2x}$ où u est une fonction dérivable de la variable x ; déterminer u de façon que y soit solution de (E) ;

③ – En déduire la solution générale de l'équation (E).

Devoir en classe n°2

Devoir 2 ; BTS 1 Analyses Biologiques ;
Année scolaire 2005/2006 ;
Le Lundi 7 Novembre 2005

Classer les équations différentielles suivant la méthode de résolution en trois catégories :
Rechercher la solution générale de l'équation par utilisation du théorème général.

Le second membre est constant.

Recherche de la solution générale de l'équation par utilisation de la méthode dite « de variation de la constante ».

(1) : $6q'(t)+q(t)=-0,003t+1,982$; $h(t)=at+b$; $q(0)=0$;

(2) : $y'(t)+0,1y(t)=1$; $y(0)=0$;

(3) : $y'+0,5y=0,5e^{-0,5t}$; $h(t)=ate^{-0,5t}$; $h(0)=0$;

(4) : $\frac{dy}{dx}+0,02y=1,0872e^{-0,02x}$; $h(x)=axe^{-0,02x}$; $y(0)=0$;

(5) : $\frac{dy}{dx}=ay$; $y(5)=8,65$; $y(3)=1,42$;

(6) : $y'=a(y-2)$; $y(0)=170$; $y(6)=9$;

(7) : $4y'+y=1200e^{-0,25x}$; $h(x)=axe^{-0,25x}$; $f(6)=0$;

(8) : $y'+y=-1,25e^{-0,5t}$; $h(t)=ke^{-0,5t}$; $f(0)=2,5$;

(9) : $y'+0,032y=0$; $f(0)=30$;

(10) : $s'(t)+0,01s(t)=0,39$; $s(0)=0,12$;

(11) : $2y'-y=x^2$; $f(x)=ax^2+bx+c$; $f(0)=0$;

(12) : $y'-2y=e^{-x}$; $f(x)=u(x)e^{2x}$; $f'(0)=0$;

(13) : $y'+0,3y=36$; $y(0)=0$;

(14) : $y'(t)+10ky(t)=2$; $y(0)=18$; $k=5 \cdot 10^{-3}$;

Un médicament dosé à 5 mg de principe actif est absorbé par voie orale. Le principe actif traverse la muqueuse intestinale, passe dans le sang, puis est éliminé. On appelle $Q(t)$ la quantité de principe actif, exprimé en mg, présente dans le sang à l'instant t ($t \geq 0$ donné en heures) et f la fonction définie pour $t \geq 0$ par la condition (C) suivante :

$$(C) f(t) = Q'(t)$$

Après étude on constate que la fonction f est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y' + y = -1,25 e^{-0,5t}, \text{ et quelle vérifie } f(0) = 2,5$$

① – Résoudre l'équation différentielle (E) et en déduire l'expression de $f(t)$. (on pourra chercher une solution particulière de la forme $h(t) = k e^{-0,5t}$, k étant un réel à déterminer) ;

Solution :

f définie pour $t \geq 0$ est solution de l'équation différentielle :

$$(E) : y' + y = -1,25 e^{-0,5t}, \text{ et } f(0) = 2,5$$

Méthode n°1 (application du théorème fondamental)

① a) Résolution de (E_1) l'équation (différentielle linéaire) homogène associée :

$$(E_1) : y' + y = 0$$

La solution générale de l'équation (différentielle linéaire) homogène est l'ensemble des fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y = g(t) = C e^{-t}$, C constante réelle.

☞ b) Recherche d'une solution particulière h de (E) sous la forme $h(t) = k e^{-0,5t}$, t réel:

Puisque $h(t) = k e^{-0,5t}$ donc $h'(t) = -0,5 k e^{-0,5t}$.

h solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; h'(t) + h(t) = -1,25 e^{-0,5t}$

h solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; -0,5 k e^{-0,5t} + k e^{-0,5t} = -1,25 e^{-0,5t}$

En divisant les deux membres par $e^{-0,5t}$ nombre strictement positif.

h solution de (E) équivalent à : $-0,5 k + k = -1,25$

Ainsi $k = -1,25 / 0,5 = -2,5$

La solution particulière de l'équation (différentielle linéaire) (E) est l'ensemble des fonctions h définies sur $[0 ; +\infty[$ par $h(t) = -2,5 e^{-0,5t}$.

☞ c) Application du théorème général :

La solution générale de (E) est la somme de la solution générale de (E_1) et d'une solution particulière de (E) : ce sont les fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y = f(t) = C e^{-t} + -2,5 e^{-0,5t}$, C constante réelle.

Recherche de la solution particulière de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 2,5$:

$f(0) = C e^0 - 2,5 e^0 = 2,5$ donc : $f(0) = C - 2,5 = 2,5$ donc $C = 5$.

La solution particulière de (E) est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $y = f(t) = 5 e^{-t} + -2,5 e^{-0,5t}$.

Méthode n°2 : méthode dite de " variation des constantes "

☞ a) Résolution de (E_1) l'équation (différentielle linéaire) homogène associée :

$$(E_1) : y' + y = 0$$

La solution générale de l'équation (différentielle linéaire) homogène est l'ensemble des fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y = g(t) = C e^{-t}$, C constante réelle.

☞ b) Recherche d'une solution de (E) sous la forme $f(t) = u(t) e^{-t}$, t réel où u est une fonction inconnue définie et dérivable sur $[0 ; +\infty[$.

Puisque $f(t) = u(t) e^{-t}$ donc $f'(t) = u'(t) e^{-t} - u(t) e^{-t}$.

f solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; f'(t) + f(t) = -1,25 e^{-0,5t}$

f solution de (E) équivalent à :

pour tout t de $[0 ; +\infty[; u'(t) e^{-t} - u(t) e^{-t} + u(t) e^{-t} = -1,25 e^{-0,5t}$

f solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; u'(t) e^{-t} = -1,25 e^{-0,5t}$

sachant que la quantité e^{-t} est strictement positive pour tout t réel :

f solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; u'(t) = -1,25 e^{-0,5t} e^t = -1,25 e^{0,5t}$

f solution de (E) équivalent à : pour tout t de $[0 ; +\infty[; u(t) = -1,25 / 0,5 e^{0,5t} + k = -2,5 e^{0,5t} + k.$

La solution générale de (E) est l'ensemble des fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par $y = f(t) = k e^{-t} - 2,5 e^{-0,5t}$, k constante réelle.

Recherche de la solution particulière de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 2,5$:

$f(0) = k e^0 - 2,5 e^0 = 2,5$ donc : $f(0) = k - 2,5 = 2,5$ donc $k = 5$.

La solution particulière de (E) est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $y = f(t) = 5 e^{-t} - 2,5 e^{-0,5t}$.

② – Vérifier que la fonction Q définie pour tout $t \geq 0$ par $Q(t) = 5 (e^{-0,5t} - e^{-t})$ satisfait la condition (C) de l'énoncé : (C) $f(t) = Q'(t)$

Puisque $f(t) = 5 e^{-t} - 2,5 e^{-0,5t}$ donc, en intégrant, $Q(t) = 5 (-e^{-t}) - 2,5 / (-0,5) e^{-0,5t} + k$

Donc : $Q(t) = 5 (-e^{-t}) - 2,5 / (-0,5) e^{-0,5t} + k = 5 (-e^{-t}) + 5 e^{-0,5t} + k = 5 (-e^{-t} + e^{-0,5t}) + k$

Sachant que la quantité de principe actif absorbée au départ est nulle donc $Q(0) = 0$.

Recherche de la solution particulière de (C) vérifiant la condition initiale $Q(0) = 0$.

$Q(0) = 5 (e^{-0} - e^0) + k = k = 0$.

La solution particulière de (C) est la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $Q(t) = 5 (e^{-0,5t} - e^{-t})$.

③ – Etudier la fonction Q sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$. On montrera que Q admet un maximum dont on précisera la valeur exacte et on calculera la limite de Q en $+\infty$.

☞ Etude de la fonction Q en $+\infty$:

puisque $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-0,5t} = 0$ et que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = 0$ donc $\lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = 0$

☞ Calcul de la dérivée :

$Q'(t) = f(t) = 5 e^{-t} - 2,5 e^{-0,5t} = 5 e^{-t} (1 - 0,5 e^{0,5t})$ sachant que $5 e^{-t}$ est strictement positif donc signe de $Q'(t) =$ signe de $(1 - 0,5 e^{0,5t})$.

Résolution de l'inéquation : $1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ pour t de $[0 ; +\infty[$:

$1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ équivalent à $2 - e^{0,5t} \geq 0$

$1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ équivalent à $2 \geq e^{0,5t}$

$1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ équivalent à $\ln 2 \geq \ln e^{0,5t}$ (la fonction ln est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$)

$1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ équivalent à $\ln 2 \geq 0,5t$

$1 - 0,5 e^{0,5t} \geq 0$ équivalent à $2 \ln 2 \geq t$.

$Q'(t)$ est positif pour t de $[0 ; 2 \ln 2]$, $Q'(t)$ est négatif pour t de $[2 \ln 2 ; +\infty[$ donc la dérivée s'annule en changeant de signe en $2 \ln 2$. La fonction Q admet un maximum pour $t = 2 \ln 2$.

$$p(A \cap B) = p(A)p\left(\frac{B}{A}\right) = p(B)p\left(\frac{A}{B}\right)$$

Puisque les évènements sont indépendants:

$$p(A \cap B) = p(A)p(B)$$