Première ES 1 - Année Scolaire 2009-2010
Chapitre n°4 : Polynômes du second degré -
Forme canonique et parabole page 166 - 187

Avant-Propos:

Une fonction ayant pour expression $f(x) = a\,x^2 + bx + c$,
peut également s'écrire $f(x) = a\,(x-\alpha)^2 + \beta$.

La représentation graphique de f est ***une parabole de sommet*** $S(\alpha\,;\beta)$.

Cette valeur α correspond à l'abscisse du sommet de la parabole ; $\alpha = -\dfrac{b}{2a}$

Rappel :

Soit $p(x) = a\,x^2 + bx + c$ polynôme (trinôme) du second degré que l'on appellera aussi trinôme.

Si la quantité : $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$

alors $p(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$; $x_1 = -\dfrac{b-\sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_2 = -\dfrac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

Progression :

Leçon n°1 : Polynôme du second degré ;

L'essentiel du cours :

A retenir : page 177 ;

Les exercices d'entraînement :

Formes canoniques ;
Ex n°4 & 5 & 6 page 178 ; ex n°10 page 179 ;

Factorisations et équations ;
Ex n°22 & 30 page 180 ;

Signe du trinôme ;
Ex n°35 page 181 ; ex n°51 & 52 page 182 ;

Approfondissement ;
Ex n°62 & 69 page 183 ;
Devoir maison :
Exercice n°87 page 187 :
Exclusion du cours :
Exercice n°89 page 187 , ex n°54 & 61 page 183 ;

SOME RIGHTS RESERVED

Fait à Nantes le mercredi 14 octobre 2009 15:04:54

Première ES 1 - Année Scolaire 2009-2010
Chapitre n°4 : Polynômes du second degré - Forme canonique et parabole page 166 - 187





Pour les exercices 36 à 41, résolvez de même les équations suivantes.

36 $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$.

Aide : L'équation a deux solutions.

37 $3x^4 + 7x^2 + 2 = 0$.

Aide : L'équation n'a pas de solutions.

38 $3x^4 - 12x^2 = 0$.

Aide : L'équation a trois solutions.

★ **39** $\frac{1}{2} - 4x^4 - x^2 = 0$.

★ **40** $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$.

★ **41** $4x^4 - 3x^2 + 12 = 0$.

Deux méthodes de résolution

Pour les exercices 42 à 46, résolvez chaque équation de deux façons :
– en factorisant le premier membre ;
– en développant et en utilisant les formules de résolution.

42 $4x^2 - (x-2)^2 = 0$.

★ **43** $x(3-x) + 6 - 2x = 0$.

44 $(x+3) - (x-1)(x+3) = 0$.

★ **45** $50 - 2(2-3x)^2 = 0$.

★ **46** $x^2 - x - 3(x-1) = 0$.

Inconnue au dénominateur

Pour les exercices 47 à 52, résolvez l'équation proposée. Vous pouvez vous reporter, si besoin, au TD1, page 129.

47 $\frac{7x^2 - 3x - 34}{x-1} = 0$.

48 $\frac{-x^2 + 5x + 6}{2x+1} = 0$.

49 $5x + 9 - \frac{2}{x} = 0$.

Aide : Commencez par réduire au même dénominateur.

50 $-\frac{1}{x} + \frac{2}{x+3} = 2$.

Aide : Commencez par réduire au même dénominateur.

★ **51** $\frac{-x^2 + 5x - 6}{x+1} = 0$.

★ **52** $\frac{2}{x+3} + \frac{1}{x^2+3x} = \frac{1}{2}$.

Inéquations du second degré

Pour les exercices 53 à 62, résolvez l'inéquation.

53 $x^2 - x + 1 \geqslant 0$.

54 $4x^2 - x + 1 < 0$.

55 $-3x^2 + 15 < 0$.

56 $-5x^2 + 4x + 1 \geqslant 0$.

57 $3x^2 - 4x + \frac{4}{3} < 0$.

58 $30x^2 < 0{,}2 - x$.

59 $x^2 < x\sqrt{2} + \frac{1}{2}$.

60 $2x < x^2 - 1$.

★ **61** $(1-x)^2 < -x^2$.

★ **62** $(2-3x)^2 \leqslant (1-x)^2$.

Tableau de signes

63 Un exemple guidé

On pose $f(x) = (x^2 + x - 6)(x + 1)$.

1. Expliquez pourquoi le signe de $f(x)$ est indiqué dans le tableau ci-dessous.

x		-3		-1		2	
$x^2 + x - 6$	+	0	−		−	0	+
$x + 1$	−		−	0	+		+
$f(x)$	−	0	+	0	−	0	+

2. Déduisez de ce tableau l'ensemble des solutions de l'inéquation $(x^2 + x - 6)(x + 1) < 0$.

Pour les exercices 64 à 67, résolvez chacune des inéquations en faisant un tableau de signes.

64 $(-6x^2 - x + 2)(x + 2) \geqslant 0$.

65 $(2 - x)(x^2 + 3x - 4) < 0$.

66 $(x + 10)(-3x^2 + 5x - 4) > 0$.

2 Équation $ax^2+bx+c=0$ Factorisation et signe du trinôme

L'existence des solutions de l'équation $ax^2+bx+c=0$ dépend du signe du **discriminant** $\Delta = b^2-4ac$ du polynôme $P(x)=ax^2+bx+c$, avec $a\neq 0$.

On admet les résultats ci-dessous :

discriminant $\Delta = b^2-4ac$	$\Delta<0$	$\Delta=0$	$\Delta>0$
solutions de l'équation $ax^2+bx+c=0$	pas de solution	une seule solution : $\alpha=\frac{-b}{2a}$ (solution double)	deux solutions distinctes : $x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
factorisation de $P(x)$	pas de factorisation	$P(x)=a(x-\alpha)^2$	$P(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$
$a>0$ • position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses			
	x : $-\infty$ … $+\infty$; $P(x)$: +	x : … α … ; $P(x)$: + 0 +	x : … x_1 … x_2 … ; $P(x)$: + 0 − 0 +
• *signe* de $P(x)$ $a<0$			
	x : $-\infty$ … $+\infty$; $P(x)$: −	x : … α … ; $P(x)$: − 0 −	x : … x_1 … x_2 … ; $P(x)$: − 0 + 0 −

• Lorsque l'équation $ax^2+bx+c=0$ admet des solutions, ces solutions sont les **racines** du trinôme ax^2+bx+c.
Ce sont les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses.

• Lorsque le polynôme a deux racines distinctes x_1 et x_2, l'abscisse α du sommet de la parabole est la moyenne des deux racines : $\alpha=\frac{x_1+x_2}{2}$.

Pour les exercices 4 à 6

Écrire chaque trinôme sous forme canonique.

4 a) $x^2 - 10x + 16$ b) $5x^2 - 20x - 105$

5 a) $x^2 + 7x - 8$ b) $3x - 3x^2 + 15$

6 a) $\frac{1}{2}x^2 + x - 4$ b) $-5x^2 + 15x - 3$

10 Voici la trajectoire suivie par un poids lors d'un lancer.



1. Lire sur le graphique, approximativement :
a) la hauteur maximale du poids ;
b) la longueur du lancer.
2. La fonction h représentée ci-dessus est donnée par :

$$h(x) = -0{,}07x^2 + 0{,}84x + 2.$$

a) Écrire la forme canonique de $h(x)$.
b) En déduire la hauteur maximale du poids.
c) Utiliser la forme canonique pour calculer la longueur du lancer.

22 Résoudre chacune des équations suivantes.

a) $3x^2 - 14x + 8 = 0$ b) $-4x^2 + 7x - 5 = 0$

c) $\frac{x^2}{4} - \frac{3}{2}x + \frac{9}{4} = 0$ d) $8x - 6 - x^2 = 0$

30 f et g sont les fonctions définies par :
$f(x) = x^2 - 5x + 4$
et $g(x) = -2x^2 + 5x$.
Voici les paraboles $\mathscr{C}_f$, $\mathscr{C}_g$ représentant f et g à l'écran d'une calculatrice (*fenêtre graphique* : $-1 \leqslant x \leqslant 6$ et $-4 \leqslant y \leqslant 6$).



1. a) Lire sur le graphique des valeurs approchées des abscisses des points d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

b) Calculer les valeurs exactes de ces abscisses.

2. h est la fonction définie par $h(x) = \frac{3}{2}x^2 - 9x + 14$.

a) Représenter les fonctions f, g, h à l'écran de la calculatrice. Conjecturer le nombre de points d'intersection de $\mathscr{C}_h$ et $\mathscr{C}_g$, puis de $\mathscr{C}_h$ et $\mathscr{C}_f$.

b) Déterminer par le calcul les abscisses des points d'intersection de $\mathscr{C}_h$ avec $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

35 On se propose d'étudier le signe du trinôme $3x^2 - 10x - 25$ selon les valeurs du réel x.

a) Calculer le discriminant de ce trinôme.

b) Résoudre l'équation $3x^2 - 10x - 25 = 0$.

c) Recopier et compléter le tableau de signes :

x	…	…
$3x^2 - 10x - 25$	… 0 … 0 …	

Vérifier la cohérence de vos réponses à l'aide de la représentation de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 10x - 25$ à l'écran d'une calculatrice.

51 **1.** Résoudre chacune des inéquations :

a) $-\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x+1 \geqslant 0$ **b)** $-\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x+1 < x+2$.

2. À l'écran de la calculatrice, tracer la droite Δ d'équation $y = x+2$ et la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = -\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x+1$.

Donner une interprétation graphique des résultats obtenus à la question **1.**

52 Une entreprise produit de la farine de blé.

On note q le nombre de tonnes de farine fabriquée avec $0 < q < 80$.

Ce graphique donne la courbe représentant la fonction coût total C (en rouge) et la courbe représentant la fonction recette totale R (en vert).



a) Lire graphiquement les quantités de farine que doit produire l'entreprise pour que la production soit rentable.

b) On sait que $C(q) = 2q^2+10q+900$ et que $R(q) = 120q$.

Reprendre la question **a)** par le calcul.

Vrai ou faux

Pour les exercices 62 à 69
Dire si l'affirmation est vraie ou fausse.
Justifier cette réponse.

62 La parabole ci-contre représente la fonction $x \mapsto 2x^2 + 4x + 1$.



63 La parabole qui représente la fonction $x \mapsto -x^2 + 8x - 20$, ne coupe jamais l'axe des ordonnées.



64 L'ensemble des solutions de l'équation $x^3 = 9x$ est $\{-3 ; 3\}$.

65 L'équation $7x + 20x^2 - 6 = 0$ a pour solutions $\frac{-10-\sqrt{142}}{7}$ et $\frac{-10+\sqrt{142}}{7}$.

66 L'expression $-5x^2 + 20x - 20$ se factorise sous la forme $-5(x-2)^2$.

67 L'inéquation $x^2 \geqslant 4$ a pour ensemble de solutions $[2 ; +\infty[$.

68 Pour tout réel x, $-x^2 - 10x - 24 < 0$

69 La parabole qui représente $x \mapsto 2x^2 + 4x + 3$ est au-dessus de la parabole qui représente $x \mapsto \frac{5}{2}x^2 + \frac{15}{4}x - 8$, sur $\mathbb{R}$.



89 Essai de modélisation des dépenses

Ce tableau donne les dépenses de fonctionnement d'une administration, de 1996 à 2004.
Ces dépenses sont exprimées en points PIB (produit intérieur brut).

année	1996	1997	1998	1999	2000
rang x_i	0	1	2	3	4
dépense y_i	0,7	1,52	1,99	2,21	2,30

année	2001	2002	2003	2004
rang x_i	5	6	7	8
dépense y_i	2,1	2,85	1,95	1,9

On recherche un polynôme du second degré f qui rend compte approximativement de cette évolution. On dira que « f est acceptable » si pour chaque valeur de x_i, la distance entre $f(x_i)$ et y_i est inférieure à 0,1.

1. Représenter dans un repère orthogonal (*unités graphiques* : 2 cm en abscisses et 5 cm en ordonnées) les neuf points $M_i(x_i ; y_i)$.

2. On note f la fonction définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$, b, c réels) dont la courbe représentative $\mathcal{P}$ passe par les points de coordonnées (1 ; 1,5), (2 ; 2) et (4 ; 2,3).

a) Écrire un système de trois équations à trois inconnues qui traduit le fait que $\mathcal{P}$ passe par ces trois points.

b) Résoudre ce système et en déduire l'expression de $f(x)$.

c) Tracer la parabole $\mathcal{P}$ représentant f sur le graphique de la question 1.

d) La fonction f ainsi déterminée est-elle acceptable ?

QCM

Pour les exercices 54 à 61
Indiquer la bonne réponse par a, b ou c.

54 La forme canonique du trinôme $3x^2 - 9x + 13$ est...

a $3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{25}{4}$ b $3(x-3)^2 - 14$

c $3\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{43}{4}$

55 Dans un repère, la parabole représentant la fonction $x \mapsto -2x^2 + 5x - 7$ a pour sommet le point...

a $S\left(-\frac{5}{4} ; -\frac{131}{8}\right)$ b $S\left(\frac{5}{2} ; -7\right)$ c $S\left(\frac{5}{4} ; -\frac{31}{8}\right)$

56 L'équation $x^2 - 3x = 0$ admet...

a 3 pour seule solution b deux solutions : 0 et – 3
c deux solutions : 0 et 3

57 Le discriminant du trinôme $-4x^2 + 7x + 2$ est...

a – 81 b 17 c 81

58 L'équation $121x^2 - 44x + 5 = 0$ ...

a admet deux solutions distinctes
b n'admet aucune solution
c admet une solution double

59 L'équation $3x^2 + 242x = 5\,800$ ...

a admet deux solutions distinctes
b admet une seule solution
c n'admet aucune solution

60 L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 6x + 5 \leqslant 0$ est...

a $]-\infty ; -5]$ b $]-\infty ; 1] \cup [5 ; +\infty[$ c $[1 ; 5]$

61 Dans un repère, $\mathcal{P}$ est la parabole représentant la fonction $x \mapsto -\frac{1}{2}x^2 + 7x + \frac{15}{2}$. $\mathcal{P}$ est au-dessus de l'axe des abscisses sur...

a $[-1 ; +\infty[$ b $[-1 ; 15]$ c $[-1 ; 1]$


Hauteur h(x) en mètres
y
y=h(x)=-0,07x²+0,84x+2
Distance x en mètres
0
2
4
6
8
10
12
14
1
2
3
4
5


y
y=R(q)
y=C(q)
x
0
10
20
30
40
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Première ES 1 - Année Scolaire 2009-2010
Chapitre n°4 : Polynômes du second degré -
Forme canonique et parabole page 166 - 187



x	$-\infty$ $+\infty$
$p(x)=$	



x	$-\infty$ $+\infty$
$p(x)=$	

x	$-\infty$ $+\infty$
$p(x)=$	





x	$-\infty$ $+\infty$
$p(x)=$	

Première ES 1 - Année Scolaire 2009-2010
Chapitre n°4 : Polynômes du second degré -
Forme canonique et parabole page 166 - 187